

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. A, D, T ve Y rakamları için

$$\begin{array}{r} \text{TYT} \\ \text{AYT} \\ + \text{YDT} \\ \hline 2024 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} A > T \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 9 \quad 8 \end{array}$$

toplama işlemi veriliyor.

$$\text{TYT} < \text{AYT}$$

$$2^2 \cdot 6^6 \cdot 8^8 = 264$$

olduğuna göre $Y \cdot D \cdot T$ çarpımı kaçtır?

- A) 48 B) 64 C) 80 D) 96 E) 112

$$103T + 120Y + 100A + 10D = 2024$$

$$824 + 120Y + 900 + 10D = 2024$$

$$120Y + 10D = 300$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \quad 6 \end{array}$$

2. a, x ve y pozitif gerçel sayıları için

$$2 / -2x^2 + y^2 = 2a$$

$$+ 3x^2 - 2y^2 = -6a$$

olduğuna göre $\frac{y}{x}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) 3

$$\begin{array}{l} -x^2 = -2a \\ \boxed{x^2 = 2a} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} -4a + y^2 = 2a \\ \boxed{y^2 = 6a} \end{array}$$

$$\frac{y^2}{x^2} = 3 \quad \frac{y}{x} = \sqrt{3}$$

3. a bir rakam olmak üzere $25!$ sayısının $23! - a$ sayısına bölümünden kalan 60^2 olduğuna göre a kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

$$60 \cdot 60 = 5 \cdot 12 \cdot 5 \cdot 12 \\ 25 \cdot 24 \cdot 6$$

$$25! - 60^2 = k \cdot (23! - a)$$

$$25 \cdot 24 \cdot 23! - 25 \cdot 24 \cdot 6 = k \cdot (23! - a)$$

$$25 \cdot 24 [23! - 6] = k \cdot (23! - a)$$

$$a = 6$$

4. x, y ve z birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere

$$x + y \cdot z = 21$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $x + y + z$ toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

$$\begin{array}{c} x + y \cdot z = 21 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 11 \quad 2 \cdot 5 \end{array}$$

5. a bir tam sayı olmak üzere $\Delta < 0$ ise yok

Değer pozitif

$$0 < |x^2 - 2x + 2| - x^2 - x < a$$

eşitsizliğini sağlayan yalnızca 4 tane x tam sayısı vardır.

Buna göre a tam sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 33 B) 36 C) 39 D) 42 E) 45

$$0 < x^2 - 2x + 2 - x^2 - x < a$$

$$0 < -3x + 2 < a$$

$$-2 < -3x < a - 2$$

$$\frac{2}{3} > x > \frac{a-2}{-3}$$

$$0 < -1 < -2 < -3$$


$$-3 > \frac{a-2}{-3} \geq -4$$

$$9 < a - 2 \leq 12$$

$$11 < a \leq 14$$

$$12, 13, 14$$

6. Dik koordinat düzleminde $[0, 1]$ kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonları ile $y = x$ doğrusunun grafikleri aşağıda verilmiştir.



(0,1) açık aralığındaki a, b ve c gerçel sayıları için

$$a < f(a) < g(a)$$


$$g(b) < b < f(b)$$

$$c < g(c) < f(c)$$

eşitsizlikleri sağlandığına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

- A) $a < b < c$ B) $a < c < b$ C) $b < a < c$
D) $c < a < b$ E) $c < b < a$

7.



Dik koordinat düzleminde f, g ve h doğrusal fonksiyonlarının grafikleri şekilde gösterilmiştir. Bu fonksiyonlarla ilgili

$$f(x-5) = g(x)$$

$$h(x) = -f(x) \quad f(x) \text{ in } x \text{ eksenine göre simetrisi } h(x)$$

eşitlikleri verilmiştir.

Buna göre $f(0)$, $g(0)$ ve $h(0)$ değerleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

- A) $g(0) < f(0) < h(0)$ B) $f(0) < h(0) < g(0)$
C) $f(0) < g(0) < h(0)$ D) $g(0) < h(0) < f(0)$
E) $h(0) < g(0) < f(0)$

8. A ve B kümeleri ile ilgili

$$s(A \cap B) = 5$$

$$s((A \times B) \cup (B \times A)) = 209$$

eşitlikleri verilmiştir.

$$s(A \times B) = s(B \times A)$$

Buna göre $A \cup B$ kümesinin eleman sayısı kaçtır?

- A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

$$A \times B = C$$

$$s((A \times B) \cup (B \times A)) = s(C \cup D) = s(C) + s(D) - s(C \cap D)$$

$$209 = s(C) + s(D) - 25$$

$$234 = s(C) + s(D)$$

$$234 = 2 \cdot s(A \times B)$$

$$s(A \times B) = 117$$

$$s(A) \cdot s(B) = 117$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$9 \quad 13$$

$$4 + 5 + 8 = 17$$

$$4 + 5 + 8 = 17$$

9. A ve B kümeleri ile ilgili

① p: $s(B \setminus A) = 1$

② q: $s(A) \geq s(B)$

③ r: $s(A \cup B) = 8$

önergeleri için

$(p \Rightarrow r) \vee (q \wedge p) \equiv 0$

önergemesinin yanlış olduğu biliniyor.

Buna göre $A \cap B$ kümesinin eleman sayısı kaçtır?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4


$7 < x+1$
 $6 < x$

$p \Rightarrow r \equiv 0$

$1 \Rightarrow 0 \equiv 0$

$q \wedge 1 \equiv 0$

$q \equiv 0$



11. a ve b gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde


$f(x) = x^3 + 9x^2 + ax + b$

biçiminde tanımlanan f fonksiyonu; pozitif gerçel sayılarda pozitif, negatif gerçel sayılarda negatif değerler almaktadır.

Buna göre a sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 9 B) 13 C) 17 D) 21 E) 25

$f(x) = x^3 + 9x^2 + ax$
 $f(x) = x(x^2 + 9x + a)$
 $81 - 4a < 0$
 $81 < 4a$
 $\frac{81}{4} < a$
 $\min(a) = 21$



12. Ortak farkı r olan bir (a_n) aritmetik dizisi için

$a_{30} - a_{25} < 53$

$a_m - a_n = (m-n) \cdot r$

$a_{25} - a_8 > 53$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre r sayısının alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 49 B) 56 C) 64 D) 72 E) 84

$5r < 53$
 $17r > 53$
 $\frac{53}{17} < r < \frac{53}{5}$
 $r = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 49

10. a ve b pozitif gerçel sayılar olmak üzere

$ax^2 - 2x + b = 0$

$bx^2 - 3bx + a = 0$

denklemlerinin her birinin kökler toplamı, kökler çarpımından 1 fazladır.

Buna göre kökleri a ve b olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $9x^2 + 8x + 18 = 0$

B) $9x^2 - 14x + 8 = 0$

C) $9x^2 - 18x + 14 = 0$

D) $9x^2 - 8x + 14 = 0$

E) $9x^2 - 18x + 8 = 0$

$\frac{2}{a} = \frac{b}{a} + 1$

$2 = b + a$

$\frac{3b}{b} = \frac{a}{b} + 1$

$3b = a + b$ $a = 2b$

$2 = 3b$

$b = \frac{2}{3}$

$a = \frac{4}{3}$

$T = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$

$G = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$

$x^2 - Tx + G = x^2 - 2x + \frac{8}{9} = 0$

$9x^2 - 18x + 8 = 0$

13. a, x ve y pozitif gerçel sayılar olmak üzere küçüktten büyüğe doğru sıralanmış

$$\log_a x, \log_a y, \log_a(x+y)$$

sayıları ardışık tam sayılar olduğuna göre $\log_a(2a+1)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 2 D) 3 E) 4

$$\log_a y - \log_a x = 1$$

$$\log_a \frac{y}{x} = 1$$

$$\frac{y}{x} = a$$

$$\log_a(x+y) - \log_a x = 2$$

$$\log_a \frac{x+y}{x} = 2$$

$$\frac{x+y}{x} = a^2$$

$$\frac{x}{x} + \frac{y}{x} = a^2$$

$$1 + a = a^2$$

$$\log_a(a+a^2) = \log_a(a+a^2)$$

$$= \log_a(a(a+1))$$


$$= \log_a(a \cdot a^2) = \log_a a^3 = 3$$

14. Melisa; her birinin yarıçapı farklı bir doğal sayı olacak biçimde yarıçapları 1 cm, 2 cm, 3 cm, ..., 10 cm olan daire biçimindeki 10 kartonu bir masanın üzerine merkezleri çakışacak şekilde üst üste dizecektir.

Melisa bu dizilimi, üstten bakıldığında dairelerden yalnızca biri hiç görünmeyecek biçimde kaç farklı şekilde yapabilir?

- A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 54

$$\binom{10}{2} = 45 \quad \text{meslek} \quad 7 \text{ ve } 5 \text{ olsun}$$



15. Duru'nun evinin yakınında bulunan otobüs durağına belirli bir otobüs $\frac{7}{10}$ olasılıkla saat tam 09.02'de,

$\frac{3}{10}$ olasılıkla ise saat tam 09.03'te gelmektedir. Bu

otobüse binmek için saat tam 09.00'da evden çıkan

Duru'nun bu durağa varması $\frac{1}{2}$ olasılıkla 100 saniye,

$\frac{3}{10}$ olasılıkla 150 saniye, $\frac{1}{5}$ olasılıkla ise 250 saniye sürmektedir.

Buna göre otobüs durağa geldiği anda Duru'nun durakta bulunma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{55}{100}$ B) $\frac{59}{100}$ C) $\frac{63}{100}$ D) $\frac{67}{100}$ E) $\frac{71}{100}$

$$100 \leq n \quad 09.02 \quad 150 \leq n \quad 09.03 \quad 100 \leq n \quad 09.03$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10}$$

$$\frac{59}{100}$$

16. m ve n doğal sayılar olmak üzere

$$\left(x + \frac{5}{x^m}\right)^n$$

ifadesinin açılımındaki sabit terim 60 olduğuna göre $m + n$ toplamı kaçtır?

- A) 36 B) 35 C) 31 D) 27 E) 23

$$\binom{n}{r} x^{n-r} \left(\frac{5}{x^m}\right)^r = 60 \cdot x^0$$

$$\binom{n}{r} 5^r \cdot \frac{x^{n-r}}{x^{mr}} = 60 \cdot x^0$$

$$n - r - mr = 0$$

$$12 - 1 - m = 0$$

$$m = 11$$

$$\binom{n}{r} \cdot 5^r = 60$$

$$\binom{n}{r} = 12$$

$$n = 12$$

17.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x}) \cdot (\sqrt[3]{x} - 2)}{-x^2 + 9x - 8}$$

$x = a^6$ diyelim
 $x \rightarrow 1$
 $a \rightarrow 1$

limitinin değeri kaçtır?


- A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{7}$ **D) $\frac{1}{14}$** E) $\frac{1}{18}$

$$\lim_{a \rightarrow 1} \frac{(1-a^3)(a^2-2)}{-a^2+9a-8} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{a \rightarrow 1} \frac{(a^3-1)(a^2-2)}{a^2-9a+8} = \lim_{a \rightarrow 1} \frac{a^5-2a^3-a^2+2}{a^{12}-9a^4+8}$$

L'Hos $\lim_{a \rightarrow 1} \frac{5a^4-6a^2-2a}{12a^{11}-54a^3} = \frac{5-6-2}{12-54} = \frac{-3}{-42} = \frac{1}{14}$

18. Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan bir g fonksiyonunun tanımlı olduğu tüm noktalarda limiti vardır ve $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 14$ olarak hesaplanmıştır.

f · g fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre g(3) değeri kaçtır?

- A) 4 B) 6 **C) 8** D) 10 E) 12

$$(f \cdot g)(3^+) = (f \cdot g)(3) = f \cdot g(3)$$

$$f(3^+) \cdot g(3^+) = f(3) \cdot g(3)$$

$$4 \cdot 14 = 7 \cdot g(3)$$


$$g(3) = 8$$

19. a ve b gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat

düzleminde $y = x^2 + ax + b$ parabolü, x-eksenine ve $y = x$ doğrusuna teğettir.

Buna göre a · b çarpımı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{16}$ **E) $\frac{1}{32}$**



$$\begin{aligned} x^2 + ax + b &= x \\ x^2 + (a-1)x + b &= 0 \\ \Delta &= 0 \\ (a-1)^2 - 4b &= 0 \\ a^2 &= (a-1)^2 \\ a^2 &= a^2 - 2a + 1 \\ a &= 1/2 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{4} = 4b \quad \boxed{b = \frac{1}{16}}$$

20. a ve b gerçel sayılar olmak üzere

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + x + 7$$

biçiminde tanımlanan f fonksiyonu daima artandır.

f(-1) = 0 olduğuna göre b sayısının alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 11 B) 13 **C) 15** D) 17 E) 19

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + 1$$

$$\Delta \leq 0$$

$$4b^2 - 12a \leq 0$$

$$f(-1) = -a + b + 6 = 0$$

$$\boxed{a - b = 6} \quad \boxed{a = b + 6}$$

$$4b^2 - 12a \leq 0$$

$$4b^2 - 12(b+6) \leq 0$$

$$b^2 - 3b - 18 \leq 0$$

$$(b-6)(b+3) \leq 0$$

$$\begin{array}{c} -3 \quad 6 \\ + \quad - \quad + \end{array}$$

$$-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 15$$

21. k ve m gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 - mx - k$$

$$g(x) = x^3 \cdot f(x)$$

biçiminde tanımlanmaktadır.

f ve g fonksiyonlarının $x = -1$ noktasında yerel ekstremumu vardır.

Buna göre $k + m$ toplamı kaçtır?

- A) 31 B) 33 C) 35 D) 37 E) 39

$$f'(-1) = g'(-1) = 0$$

$$g'(x) = 3x^2 \cdot f(x) + x^3 \cdot f'(x)$$

$$g'(-1) = 3f(-1) - 1 \cdot f'(-1)$$

$$0 = 3f(-1) - 0$$

$$f(-1) = 0$$

$$f(-1) = -2 - 9 + m - k = 0$$

$$m - k = 11$$


$$k = 13$$

$$f'(x) = 6x^2 - 18x - m$$

$$f'(-1) = 24 - m = 0$$

$$m = 24$$

22. Dik koordinat düzleminde $y = 2 + 3x$ ve $y = 12 - x$ doğruları ile pozitif x ve y -eksenleri arasında kalan boyalı bölge aşağıda verilmiştir.



Bu bölgede bir kenarı x -ekseni üzerinde, birer köşesi ise $y = 2 + 3x$ ve $y = 12 - x$ doğruları üzerinde olan dikdörtgenler oluşturuluyor.

Buna göre bu dikdörtgenlerden alanı en büyük olanın x -ekseni üzerindeki kenarının uzunluğu kaç birimdir?

- A) 6 B) $\frac{19}{3}$ C) $\frac{20}{3}$ D) 7 E) $\frac{22}{3}$

$$(10 - 4a)(2 + 3a) = A_{\text{dik}}$$

$$20 + 30a - 8a - 12a^2 = -12a^2 + 22a + 20 = f(a)$$

$$f'(a) = -24a + 22 = 0$$

$$10 - \frac{44}{12} = 10 - \frac{11}{3} = \frac{19}{3}$$

$$23. \int_1^2 (x+2) \cdot \sqrt[3]{x^2+4x-4} dx$$

integralinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{45}{8}$ B) $\frac{47}{8}$ C) $\frac{49}{8}$ D) $\frac{45}{4}$ E) $\frac{47}{4}$

$$\int_1^2 (x+2) \cdot \sqrt[3]{x^2+4x-4} dx = \int_3^4 u \cdot \sqrt[3]{u^2-8} \cdot du$$

$$u^2 - 8 = v$$

$$2u du = dv$$

$$u du = \frac{dv}{2}$$


$$u=3 \Rightarrow v=1$$

$$u=4 \Rightarrow v=8$$

$$\int_1^8 \frac{v^{1/3}}{2} dv$$

$$\frac{3}{8} \cdot \left[\frac{3}{4} v^{4/3} \right]_1^8 = \frac{3}{8} (16 - 1) = \frac{45}{8}$$

24.



Dik koordinat düzleminde yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için

$$\int_a^c |f(x)| dx = 20 = A + B$$

$$\int_a^c f(x) dx = 8 = B - A$$

$$A = 14, B = 6$$

$$x = a/2 \Rightarrow u = a$$

eşitlikleri sağlanmaktadır.


Buna göre

$$\int_{a/2}^{b/2} f(2x) dx = \int_a^b f(u) \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_a^b f(u) du$$

integralinin değeri kaçtır?

- (A) -3 (B) -4 (C) -5 (D) -6 (E) -7

25. a bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde $y = a\sqrt{x}$ ve $y = \sqrt{x}$ fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.



Mavi boyalı bölgenin alanı A_1 , sarı boyalı bölgenin alanı A_2 olmak üzere

$$A_1 \cdot A_2 = 96$$

olduğuna göre a kaçtır?

- A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

$$\frac{8}{3} \cdot A_1 = 96$$

$$A_1 = 36$$

$$81 = 9 \cdot 3a$$

$$a = 3$$

26. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları

$$\int_1^2 f'(3x) dx = 4$$

$$\int f(2x) dx = g(x) + C, (C \text{ sabit})$$

eşitliklerini sağlıyor.

$f(3) = 5$ olduğuna göre $g'(3)$ türevinin değeri kaçtır?

- A) 1 (B) 5 (C) 9 (D) 13 (E) 17

$$\int f(2x) dx = g(x) + C$$

$$f(2x) = g'(x)$$

$$g'(3) = f(6) = 17$$

27. $a = \sin(40^\circ)$
 $b = \sec(40^\circ)$
 $c = \tan(40^\circ)$

olduğuna göre a, b ve c sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$

B) $a < c < b$


C) $b < a < c$

D) $b < c < a$

E) $c < a < b$

$\sec 40^\circ > 1$

$b > c > a$



28. $\frac{\cos(2x+y) + \sin(2x-y)}{\cos(2x) + \sin(2x)} = \frac{(\cos y - \sin y)(\cos 2x + \sin 2x)}{\cos 2x + \sin 2x}$

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\cos y - \sin y$

B) $\cos y + \sin y$

C) $\cos x - \sin y$

D) $\sin x - \cos y$

E) $\sin x - \cos x$

$\cos 2x \cdot \cos y - \sin 2x \cdot \sin y + \sin 2x \cdot \cos y - \sin y \cdot \cos 2x$
 $\cos 2x [\cos y - \sin y] + \sin 2x [\cos y - \sin y]$
 $[\cos y - \sin y] [\cos 2x + \sin 2x]$

29. $0 < a < \frac{\pi}{2}$ olmak üzere

$\cos^2 a - \cos(2a) = \sin(2a)$

eşitliğini sağlayan a değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $\tan a = \frac{1}{5}$

B) $\cot a = \frac{2}{\sqrt{5}}$

C) $\cos a = \frac{1}{\sqrt{5}}$

D) $\operatorname{cosec} a = \sqrt{5}$

E) $\sin(2a) = \frac{3}{5}$

$\sin a = 0$

veya

$\sin a = 2 \cos a$

$\tan a = 2$



30. $0 \leq x \leq \pi$ olmak üzere

$\sqrt{2} \sin(4x) - \cos(8x) = 1$

eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) $\frac{\pi}{3}$

B) $\frac{3\pi}{4}$

C) π

D) $\frac{3\pi}{2}$

E) 2π

$\sqrt{2} \sin 4x = 1 + \cos 8x$ (1 den kurtul)
 $2 \cos^2 4x - 1$

$\sqrt{2} \sin 4x = 2 \cos^2 4x$

$\sqrt{2} \sin 4x = 2 [1 - \sin^2 4x]$

$\sqrt{2} \cdot a = 2 \cdot [1 - a^2]$

$\sqrt{2} a = 2 - 2a^2$

$2a^2 + \sqrt{2} a - 2 = 0$

$\frac{\sqrt{2} a}{\sqrt{2} a} = \frac{-1}{+2}$

$(\sqrt{2} a - 1)(\sqrt{2} a + 2)$

$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad a = \frac{-2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$

$\sin 4x = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin 4x = -\sqrt{2}$

$\sin 4x = \sin \frac{\pi}{4}$

$4x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$

$\sin 4x = \sin \left(\pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right)$

$x = \frac{\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}$

$4x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$

$x = \frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}$


$\left\{ \frac{\pi}{16}, \frac{3\pi}{16} \right\}$

$\left\{ \frac{3\pi}{16}, \frac{11\pi}{16} \right\}$

$(1 + 3 + 9 + 1) \cdot \frac{\pi}{16}$

$\frac{24\pi}{16} = \frac{3\pi}{2}$

34. Merkez açısı 120° olan çember yayı biçimindeki bir telin uçları, dikdörtgen biçimindeki bir tablonun üst kenarına monte ediliyor. Bu tablo duvardaki bir çiviye, Şekil 1'deki gibi telin orta noktası çiviye denk gelecek biçimde asıldığında tablonun uzun kenarları zemine paralel oluyor.



Şekil 1

Şekil 2

Sonra bu tel çıkartılıp bükülerek yarım çember şekline getiriliyor ve tekrar tabloya monte ediliyor. Tablo aynı çiviye, yine telin orta noktası çiviye denk gelecek biçimde Şekil 2'deki gibi asıldığında tablonun uzun kenarları yine zemine paralel oluyor. Son durumda tablonun zeminden yüksekliği ilk duruma göre 8 birim azalıyor.

Buna göre telin uzunluğu kaç birimdir?

- A) 24π B) 28π C) 32π D) 36π E) 40π

$$\frac{4a}{3} - a = \frac{a}{3} = 8 \Rightarrow a = 24$$

$$R = 32 \quad \frac{2\pi \cdot R}{2} = 32\pi$$

35. Bir dik koordinat düzleminde A(9, 2), B(10, 1), C, D(4, 13), E(3, 6) ve F noktaları verilmiştir.

ABC üçgeninin ağırlık merkezi ile DEF üçgeninin ağırlık merkezi aynı nokta olduğuna göre C ve F noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

- A) 10 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20


$$\frac{9+10+C_1}{3} = \frac{4+3+F_1}{3}$$

$$C_1 + 12 = F_1$$

$$C_2 - 16 = F_2$$

$$\sqrt{(C_2 - F_2)^2 + (C_1 - F_1)^2} = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20$$

36. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen bir kenarı y-ekseninde olan kırmızı renkli kare ile bir kenarı x-ekseninde olan mavi renkli karenin birer köşeleri ortaktır.



Kırmızı ve mavi renkli karelerin birer köşesi

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \text{ doğrusunun üzerinde yer almaktadır.}$$

Buna göre kırmızı renkli karenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir?

- A) $\frac{14}{15}$ B) $\frac{15}{16}$ C) $\frac{16}{17}$ D) $\frac{17}{18}$ E) $\frac{18}{19}$

37. Dik koordinat düzleminde $2x - y = 0$, $x + 2y = 0$ ve $x - 8y + 30 = 0$ doğrularının sınırladığı üçgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21

$y = 2x$ > orijin'de kesişir $A(0,0)$

$y = -\frac{x}{2}$

$x - 8(2x) + 30 = 0 \Rightarrow 15x = 30 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow B(2,4)$

$x = -2y$

$x - 8y + 30 = 0 \Rightarrow -2y - 8y + 30 = 0 \Rightarrow -10y = -30 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow C(-6,3)$

Alan = $\frac{1}{2} \cdot |-24 - 6| = 15$

38. Dik koordinat düzleminde A(a, b) noktasının; B(3, 0) noktasına göre simetriği C noktası, y-eksenine göre simetriği ise D noktasıdır.

C ve D noktalarından geçen doğrunun denklemi

$y = -x - 1$ olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?


- A) 7 B) 13 C) 15 D) 19 E) 24

$(a, b) \xrightarrow[\text{Siretri}]{(3,0)} (6-a, -b)$ Dönüleri
 $(c, b) \xrightarrow[\text{Siretri}]{\text{Y eks}} (-a, b)$ Siflor
 $b = a - 1$ $b = -1$
 $-b = -6 + a - 1$ $b = 7 - a$
 $7 - a = -1$
 $a = 8$ $b = 3$


39. Dik koordinat düzleminde A(11, 9) noktası, $y = x$ doğrusuna B(7, 7) noktasında teğet olan bir çemberin iç bölgesinde yer almaktadır.

Buna göre bu çemberin yarıçapının birim türünden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?


- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14



40.



Şekil 1



Şekil 2

$a \cdot b = 20$
 $a \cdot b \cdot h = 180$
 $h = 9$

Küp biçiminde verilen Şekil 1'deki blok, kesikli çizgiler boyunca kesiliyor ve bu bloktan dikdörtgenler prizması biçiminde bir parça çıkarılıyor. Bu parçanın çıkarılmasıyla Şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Son durumda bloğun yüzey alanı 40 birimkare, hacmi ise 180 birimküp azalıyor.

Çıkarılan parçanın ayrıt uzunlukları birim türünden birer tam sayı olduğuna göre bu parçanın yüzey alanı kaç birimkaredir?

- A) 202 B) 216 C) 222 D) 234 E) 256

$2(a \cdot b + a \cdot h + b \cdot h)$
 $2(20 + h(a+b)) = 40 + 2 \cdot 9 \cdot (a+b)$
 $40 + 18(a+b)$
 $40 + 18(5+4)$
 $40 + 162 = 202$